




Показники ефективності розраховано на основі виробничої практики свиного господарств підприємств-партнерів, фізіологічного двору ВІТА ПФ, Інституту кормів і сільського господарства НАНУ та досягнуто за умов правильного ведення свинарства:

• задовільна селекція • високий менеджмент поголів'я • утримання тварин у чистих, сухих приміщеннях • вільний їх доступ до води • вчасне проведення ветеринарних заходів.

*Складові рецепту:

Злакові зернові (ячмінь, пшениця, кукурудза, овес, висівки пшеничні/житні) — суміші зернових компонентів згідно розроблених рецептів годівлі.

Білкові складові (макуха/шрот соняшниковий, соєвий, гороховий) з вмістом сирого протеїну > 30%, активність уреазі — 0,02.

ЖИВИНА™ — амінокислотний вітамінно-мінеральний кормовий концентрат АВМКК — головний балансуєчий компонент.

Са льцій™ Р — мінеральна суміш кальцій-фосфорна, доступна форма, баланс Са:Р, вуглеводно-натрієвий баланс.

ДИВО™ БВМД 35-15 % — білкова вітамінно-мінеральна добавка (протеїнове, енергетичне балансування кормів).

КОМБІ™ — збалансований повнораціонний комбікорм для різних статевих-вікових груп.

Норма добового споживання сухої речовини (с.р.*) для сільськогосподарських тварин, кг/добу.

Вид тварин, стать, вікова група, фізіологічний стан	Жива маса тварин та норма добового споживання сухої речовини, кг												
Свині:													
свиноматки холості (3-14 днів до парування)	ж.м.**	120-140	141-160	161-180	181-200	201-240	241-...						
	с.р.	2,48	2,67	2,86	3,05	3,14	3,24						
свиноматки в перші 84 доби супоросності	ж.м.	120-140	141-160	161-180	181-200	201-220	221-...						
	с.р.	1,90	2,10	2,29	2,47	2,57	2,67						
свиноматки в останні 30 діб супоросності	ж.м.	до 160	161-180	181-200	201-220	221-240	241-...						
	с.р.	2,57	2,76	2,95	3,05	3,14	3,24						
свиноматки підсисні старші 2 років (з 10 поросятами) при відлученні в 60 діб	ж.м.	до 140	141-160	161-180	181-200	201-220	221-...						
	с.р.	4,70	4,85	5,00	5,23	5,38	5,54						
свиноматки підсисні старші 2 років (з 10 поросятами) при відлученні в 35 діб	ж.м.	до 140	141-160	161-180	181-200	201-220	221-...						
	с.р.	4,46	4,62	4,77	5,00	5,15	5,31						
свиноматки підсисні старші 2 років (з 10 поросятами) при відлученні в 26 діб	ж.м.	120-140	141-160	161-180	181-200	201-220	221-...						
	с.р.	4,23	4,46	4,62	4,85	5,00	5,23						
поросята за раннього відлучення	ж.м.	6	8	10	12	14	16	18	20-30	31-40			
	с.р.	0,32	0,41	0,47	0,54	0,65	0,74	0,81	1,15	1,39			
поросята на дорощуванні і свині на відгодівлі при приростах за період 550г.	ж.м.	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-...					
	с.р.	1,72	1,90	2,16	2,38	2,62	2,79	3,03					
поросята на дорощуванні і свині відгодівлі при приростах за період 650г.	ж.м.	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-...					
	с.р.	1,8	2,13	2,38	2,56	2,81	2,99	3,2					
поросята на дорощуванні і свині на відгодівлі при приростах за період 800г.	ж.м.	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-...					
	с. р	1,95	2,27	2,5	2,69	2,84	3,06	3,28					
Кролі:													
самки і самці в період спокою	ж.м.	4,0	4,5	5,0									
	с.р.	0,140	0,155	0,175									
самки і самці в період парування	ж.м.	4,0	4,5	5,0									
	с.р.	0,170	0,190	0,210									
самки сукрільні	ж.м.	4,0	4,5	5,0									
	с.р.	0,185	0,210	0,230									
самки лактуючі 1-10 діб	ж.м.	4,0	4,5	5,0									
	с.р.	0,280	0,310	0,350									
самки лактуючі 11-20 діб	ж.м.	4,0	4,5	5,0									
	с.р.	0,375	0,420	0,470									
самки лактуючі 21-30 діб	ж.м.	4,0	4,5	5,0									
	с.р.	0,470	0,530	0,590									
самки лактуючі 31-45 діб	ж.м.	4,0	4,5	5,0									
	с.р.	0,570	0,640	0,710									
молодняк кролів 45-60 діб	ж.м.	1,0	1,7										
	с.р.	0,073	0,130										
молодняк кролів 61-90 діб	ж.м.	1,7	2,4										
	с.р.	0,130	0,195										
молодняк кролів 91-120 діб	ж.м.	2,4	3,0										
	с.р.	0,195	0,235										

***с.р.** – суха речовина (показник базової величини вологості кормів 12-14%)

****ж.м.** – жива маса

