

Вік		Середньодобові прирости, г	Рекомендації споживання на добу, кг.							
Місяці	Дні		Рекомендації споживання на добу, кг.		КОМБІ корм телята	Концентровані корми		Соковиті корми		Грубі корми
			Молозиво	Молоко		Злакові зернові	ДИВО 20% телята 2-6 міс	Сінаж Корнаж	Силос	Сіно
1	1-6	500-900	9		Введення					
	7-13			9	0.2					
	14-20			9	0.3					
	21-31			9	0.5					
2	32-34			9	0.6					
	35-41			9	0.8					
	42-48			9	1.0					
	49-59			6	1.0			Введення		
3	60-62			3	1,5	1,2	0,3	0.5		Без обмеження
	63-69				2.0	1.6	0.4	0.7		
	70-76				2.0	1.6	0.4	1.0		
	77-83				2.0	1.6	0.4	1.0		
	84-90				2.0	1.6	0.4	1.0	Введення	
4	91-97				2.0	1.6	0.4	1,5	0.5	
	98-104				2.0	1.6	0.4	2,0	0.5	
	105-111				2.0	1.6	0.4	2.0	1.0	
	112-120				2.0	1.6	0.4	2.0	1.0	
5	121-125				2.0	1.6	0.4	2.0	1.5	
	126-132				2.0	1.6	0.4	2.0	2.0	
	133-139				2.0	1.6	0.4	2,5	2,5	
	140-146				2.0	1.6	0.4	3.0	3.0	
	147-151				2.0	1.6	0.4	3.0	3.0	
6	152-160				2.0	1.6	0.4	3.0	3.0	
	161-167				2.0	1.6	0.4	3,5	3.5	
	168-174				2.0	1,6	0.4	4.0	4.0	
	175-181				2.5	2	0,5	4.0	4.0	
Загальна потреба			54	390	240	168	42	230	176	100

Показники ефективності розраховано на основі добової потреби в сухій речовині (показник базової величини вологості кормів (12-14%), виробничої практики господарств-партнерів, Інституту кормів і сільського господарства НАНУ.

Залежно від господарського призначення телят (ремонтний молодняк, відгодівля), кормової бази, генетичного потенціалу тварин, застосовують відповідні схеми випоювання та годівлі.

Органом травлення новонародженого теляти є сичуг, схожий на шлунок людини. Завданням тваринників на даному етапі є рання активація розвитку та росту інших передшлунків.

При збільшенні рубця, важливим є розвиток пальцеподібних відростків (папіл), що приймають участь у травленні та всмоктуванні поживних речовин. Вони активно розвиваються при згодовуванні передстартерних комбікормів КОМБІ™ телята 0-2 міс.

З четвертого дня після народження, телят привчають до споживання передстартового комбікорму КОМБІ™ (невелику його кількість кладуть в ротovu порожнину після випоювання молока). Починаючи з 10 дня комбікорм КОМБІ™ має бути в годівниці тварин постійно. Вільний доступ тварин до питної води має бути забезпечено. Високоякісний комбікорм КОМБІ™ для молочних телят згодовують до 2-х місячного віку. Загальна потреба на період становить 30-35 кг.

Формування повноцінного полігастричного травлення телят відбувається з 2-х місяців (традиційне відлучення).

З 3-го місяця тварин переводять на комбікорм КОМБІ™ телята 2-6 міс, або застосовують комбінацію злакових зернових та ДИВО 20% для телят.

• ВИРОБНИЦТВО • ПОСТАЧАННЯ • ПОСЛУГИ •

+38 (04572) 50 103, (050) 311 64 00, (067) 406 75 75, www.vita.biz.ua



Ефективна програма годівлі ремонтних телиць та бичків молочних порід з 7 місячного віку

Вік	Середньодобові прирости, г	Класифікація кормів, добова потреба, кг					
Місяці		КОМБІ корм	Концентровані корми		Соковиті корми		Грубі корми
			Злакові зернові	ДИВО БВМД 20% телята	Сінаж Корнаж	Силос	Сіно, солома
7	600-800	2	1,6	0,4	4	4	1-2
8		2	1,6	0,4	4	4	2
9		2	1,6	0,4	5	4	2
10		2	1,6	0,4	5	4	2
11		2	1,6	0,4	6	4	2
12		2,5	2	0,5	6	4	3
13		2,5	2	0,5	7	4	3
14		2,5	2	0,5	7	4	3
15		2,5	2	0,5	7	4	3
Загальна потреба на 9 місяців, кг			600	480	120	1530	1080

Показники ефективності розраховано на основі виробничої практики господарств- партнерів, Інституту кормів і сільського господарства НАНУ та потреб у сухій речовині (з показником базової величини вологості кормів (12-14%)), виробничої практики господарств-партнерів, Інституту кормів і сільського господарства НАНУ.

ДИВО 20% телята старт - білкова вітамінно- мінеральна добавка, призначена для виготовлення повнораціонних кормосумішей з використанням зернових компонентів в післямолочний період життя телят з 2-місячного віку. При годівлі ремонтного молодняку важливо враховувати фізіологічні особливості, потребу в поживних речовинах тварин, на різних етапах їх розвитку. Обов'язковим є дотримання ветеринарно-санітарних та зоотехнічних вимог згідно породних і вікових особливостей нетелів.